

collection forme un bel ensemble et comprend toutes les formes principales de chaque famille, merveilleusement conservées et très bien classées; elle rendra surtout de grands services pour l'enseignement et, à ce titre, mérite de ne pas être dissociée; on la laissera telle quelle, au laboratoire, dans le joli meuble où M. Chevret l'avait installée. La collection renferme quelques raretés d'une grande valeur, notamment des Coléoptères de Sainte-Hélène qui furent jadis recueillis par le Conservateur du tombeau de Napoléon. Certaines de ces espèces sont en voie de disparition complète, entre autres un Carabe, l'*Aplothorax Burchellii* Waterhouse, qui est représenté par plusieurs exemplaires.

On ne saurait trop remercier M^{me} la Comtesse Morand pour son acte de grande générosité.

PRÉSENTATION D'OUVRAGES.

M. le Professeur LECOMTE présente et offre pour la Bibliothèque l'ouvrage suivant :

Flore générale de l'Indo-Chine, publiée sous la direction de M. H. Lecomte, Professeur au Muséum, t. VI, fasc. I, Hydrocharidacées, Burmanniacées, Zingiberacées, Marantacées, par M. F. Gagnepain.

COMMUNICATIONS.

LISTE RAISONNÉE DES MAMMIFÈRES RECUEILLIS PAR M. A. CHEVALIER
À LA CÔTE D'IVOIRE,

PAR M. E.-L. TROUËSSART.

Cette collection est surtout remarquable par la belle série de peaux et de crânes du genre *Cercopithèque* qu'elle renferme, et dont deux types très remarquables manquaient à nos galeries de Zoologie. La distinction des espèces de ce genre, qui sont actuellement au nombre de 41 (non compris les sous-espèces), est souvent très difficile, les jeunes que l'on voit communément dans les ménageries différant notablement des adultes. En outre, leur distribution géographique est très mal connue, ces jeunes individus, achetés à la côte occidentale d'Afrique, étant amenés ordinairement de très loin dans l'intérieur. Les données précises fournies ici par M. Chevalier,

avec les noms indigènes, serviront à fixer l'habitat de plusieurs d'entre elles.

1. *COLOBUS VELLEROSUS* E. Geoff. — Septembre 1907.

Noms indigènes : *Plé* (plepo); *Blogo* (aouro); *Bolé* (negan); *Plé* (trepo); *Soula fung* (bambou).

Une peau et deux crânes.

Habitat. — Entre le Cavally et le Sassandra. L'espèce s'étend de la Sénégambie à la Côte de l'Or.

2. *COLOBUS FERRIGINEUS* Shaw.

Noms indigènes : *Duré* (negan); *Bago* (bété).

Quatre peaux et un crâne.

Habitat. — Guidéko sur le Sassandra.

3. *COLOBUS POLYCOMUS* Illiger.

Noms indigènes : *Bolé* (negan); *Buré* (bété).

Une peau (femelle pleine).

Habitat. — Guidéko sur le Sassandra.

4. *COLOBUS VERUS* Van Beneden. — Septembre 1907.

Noms indigènes : *Kabé* (negan); *Klia gogo* (plepo); *Togna lu* (aouro).

Une peau et deux crânes.

Habitat. — Entre le Cavally et le Sassandra. L'espèce est signalée depuis Sierra-Leone jusqu'à la Côte de l'Or.

5. *CERCOPITHECUS DIANA IGNITUS* Gray. — Septembre 1907.

Noms indigènes : *Galé* ou *Garé* (negan); *Gré* (dialecte de Béréhy); *Guéré* (bété).

Deux peaux (un mâle adulte et une femelle pleine), et un crâne.

J'ajouterai peu de chose à ce que j'ai dit de ce type dans le précédent *Bulletin*⁽¹⁾. La forme représentée par le beau mâle adulte (malheureusement sans la tête) que j'ai décrit dans cette note, était totalement inconnue des naturalistes. Les caractères très accusés, fournis par ce spécimen, tendraient à faire supposer que le *Cercopithecus ignitus* de Gray est une bonne espèce.

Habitat. — Entre le Cavally et le Sassandra, à 100 kilomètres environ dans l'intérieur : Guidéko sur le Sassandra. L'espèce vit au Libéria (Jentink).

⁽¹⁾ *Bulletin du Muséum*, 1908, p. 97. — C'est par suite d'une erreur d'étiquette que le crâne figuré (p. 101, fig. 1) a été rapporté à la présente espèce. Ce crâne est en réalité celui de *C. Campbelli* (ci-après, n° 8). Il est probable que le crâne de *C. diana ignitus* diffère beaucoup moins de celui de *C. voloway*. Les caractères fournis par la peau, décrite dans cette note, n'en conservent pas moins leur valeur.

6. *CERCOPITHECUS ROLOWAY* Schreber.

Une peau de mâle adulte avec son crâne.

Comme je l'ai dit dans la note déjà citée, cette forme correspond à ce que l'on désigne d'ordinaire sous le nom de *Diane* dans nos ménageries. La barbe n'a pas plus de 4 centimètres de long. Si le *Roloway* est réellement caractérisé par une barbe de 8 centimètres, la présente espèce serait le vrai *C. diana*, et ce petit groupe renfermerait trois espèces : *C. ignitus*, *C. diana* et *C. roloway*, qui se remplaceraient successivement sur la côte occidentale d'Afrique en allant du Nord au Sud et de l'Ouest à l'Est, dans l'ordre où nous venons de les nommer.

Habitat. — Forêt d'Indénié, sur la frontière de la Côte de l'Or. — Dans sa récente monographie des Cercopithèques, Pocock assigne comme habitat au *Roloway* : « Côte de l'Or et Guinée », particulièrement « Fantie ».

7. *CERCOPITHECUS PETAURISTA* Schreber.

Nom indigène : *Tué* (plebo).

Une peau d'âge moyen et une peau de jeune.

Habitat. — « Forêt de la Côte d'Ivoire » (le jeune); entre le Cavally et le Sassandra (l'autre individu).

7. *u.* *CERCOPITHECUS PETAURISTA BUTTIKOFERI* Jentink. — Juillet 1907.

Nom indigène : *Tué* (plebo).

Une peau d'adulte et un jeune avec leurs crânes.

Habitat. — Entre Cavally et Sassandra. — Le type de Jentink est du Libéria.

La distinction entre ces deux formes semble très difficile à établir. Le jeune, provenant de la Forêt de la Côte d'Ivoire » (mars 1907), présente seul nettement les caractères assignés par Pocock au type de l'espèce, c'est-à-dire le cercle noir pariéto-occipital, qui s'étale sur l'occiput en forme de W, et la bande blanche allant du coin de l'œil vers le derrière des oreilles. L'individu d'âge moyen que je lui réunis, et qui provient de la même région que ceux que je rapporte au *Buttikoferi* Jentink, forme la transition entre les deux formes, de telle sorte que l'on serait porté à supposer que les caractères assignés au Blanc-Nez type s'atténuent avec l'âge, et que *C. Buttikoferi* représente simplement l'adulte de *C. petaurista*.

8. *CERCOPITHECUS CAMPBELLI* Waterh. — Juillet 1907.

Noms indigènes : *Tudwi* (plepo); *Todwi* (aouro).

Une peau avec son crâne.

Habitat. — Entre le Cavally et le Sassandra. — Le type de l'espèce venait de Sierra-Leone.

9. *CERCOPITHECUS BURNETTI* Gray. — 26 mars 1907.

Espèce nouvelle pour nos collections. — Une peau avec son crâne.

Cette espèce, longtemps confondue avec la précédente, s'en distingue

par son diadème d'un jaune vif, les poils n'étant pas annelés: la gorge et la partie interne des bras est d'un blanc pur, nettement séparé du roux tiqueté de noir du derrière du cou et du haut du dos, par la bande noire des épaules qui se prolonge sur la face externe des bras; le bas du dos est d'un noir pur (et non d'un gris ardoisé comme chez *C. Campbelli*). La dernière molaire supérieure n'a que trois tubercules.

Habitat. — « Forêt de la Côte d'Ivoire. » Le *British Museum* possède des spécimens du Cameroun, de l'Aschanti et d'Accra. Il est probable qu'elle s'étend du Libéria au Cameroun.

10. *NANDINIA BINOTATA* Gray.

Noms indigènes : *Miagu* (negan); *Maté lu* (plepo); *Mahuo* (trepou).

Une peau avec son crâne.

Habitat. — Fort Binger.

11. *GENETTA GENETTOÏDES* Temm.

Noms indigènes : *Bomboni* (plepo); *Diangouma wava* (bambara).

Une peau (achetée aux indigènes).

Habitat. — Achetée à Grabo, sur la Cavally.

12. *ANOMALURUS PELI* Temm.

Une peau et son crâne.

Habitat. — Forêt de la Côte d'Ivoire.

13. *IDIURUS MACROTIS* Miller.

Un spécimen dans l'alcool.

Cette jolie petite espèce, qui est un *Anomalurus* en miniature, n'avait encore été signalée qu'au Cameroun.

Habitat. — Forêt de Bouronkrou, au kilomètre 95 du chemin de fer (Côte d'Ivoire).

14. *FUNISCIURUS EBII* (Temm.).

Noms indigènes : *Gurubo* (plipo); *Gogo* (negan).

Une peau et son crâne.

Habitat. — Entre Cavally et Sassandra.

15. *HELIOSCIURUS ANNULATUS* (Desm.).

Nom indigène : *Pouré* (agni).

Une peau et son crâne.

Habitat. — Indénié.

16. *PROCAVIA* sp.

Noms indigènes : *Haroua* (colons); *Mahua* (agni).

Une peau avec son crâne; trop jeune pour être déterminé.

Ce Damau vit dans les profondeurs de la forêt, faisant entendre des cris

perçants pendant la nuit. Ce cri imite le son : *Hahua*, *hahua*, allant crescendo.

Habitat. — Zaranou (Indénié).

17. CEPHALOPHUS DORIE Ogilby.

Noms indigènes : *Méné* (trepo) ; *Né* (negan) ; *Buta blabla helké* (plepo).

Une peau sans tête et sans pattes.

Habitat. — Achetée au Fort Binger.

18. CEPHALOPHUS RUFILATUS Gray.

Noms indigènes : *Guana* (plepo) ; *Na* (aouro et dialecte de Béréby) ; *Névéra* (negan).

Une peau d'un jeune sans cornes, avec son crâne.

Habitat. — Entre Cavally et Sassandra.

19. CEPHALOPHUS MAXWELLI H. Smith.

Nom indigène : *Ketebo* (agni).

Une peau avec des cornes courtes, et son crâne.

Habitat. — Grande forêt entre Bianonay et Soubiré.

20. CEPHALOPHUS NIGER Gray.

Noms indigènes : *Belé Blé* (negan) ; *Dibi* (bété).

Une peau avec son crâne (mâle adulte).

Individu de grande taille : le crâne a plus de 20 centimètres de longueur à la base. Les yeux sont d'un noir bleuâtre.

Habitat. — Guideko sur le Sassandra. L'espèce s'étend du Libéria à la Côte de l'Or.

CATALOGUE DES CRUSTACÉS DE LA FAMILLE DES STÉNOPIDES
DES COLLECTIONS DU MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE.

PAR M. E.-L. BOUVIER.

STENOPUSCULUS CRASSIMANUS Richters. — Djibouti (Contière, 1898) 3 ex.
déterminés par M. Nobili.

STENOPUS SPINOSUS A. Risso. — Nice et Saint-Hospice (*Travailleur*, 1881)
3 ; Messine (Vialleton, 1900) 1 ; Méditerranée (1883) 1.

— INSPIDES Olivier. — Mer Rouge (Jousseau, 1897) 1 ; Djibouti
(Jousseau, 1897) 1 ; Obock (Jousseau, 1897) 1 ; Djibouti
(Contière, 1898) 1 ; Sainte-Marie-de-Madagascar (Coquerel, 1862) 2 ;
Madagascar (Grandidier, 1871) 1 ; Mayotte (Coll. A. Milne-Edwards,
1900) 1 ; Seychelles (Rousseau, ex. déterminés par H. Milne-Edwards)
3 ; Vanikoro (François, 1894) 1 ; Batavia (Bleeker)